

STEMALIA

Conoce todo acerca del

CJC/IPA

Regenerative GH Blend
(Stemalia Blend)



01

Descripción General

02

Funciones Principales

03

Métodos de Administración

04

Esquema de Reconstitución

05

Efectos secundarios

+1 (972) 585-1292 | info@stemalia.com
www.stemalia.com

**Nombre del Péptido / Producto**

Stemalia Blend

CJC/IPA Regenerative GH Blend

Tipo: Blend secretagogo de hormona del crecimiento (GH-Releasing Peptides)

Clasificación: Combinación sinérgica de CJC-1295 (sin DAC) e Ipamorelin

Presentación: Viales liofilizados: CJC-1295 sin DAC (5 mg) / Ipamorelin (5 mg)

Vía de administración: Subcutánea

Aspecto: Polvo blanco liofilizado

Este blend combina CJC-1295 sin DAC e Ipamorelin en un solo vial de 10 mg totales. Ambos son potentes secretagogos de hormona del crecimiento (GH), utilizados ampliamente en medicina regenerativa, optimización metabólica y terapias de recuperación. El efecto sinérgico incrementa de manera fisiológica los pulsos de GH, mejora el sueño profundo, acelera la reparación tisular y optimiza el rendimiento físico.

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Estimulación natural del pulso de hormona del crecimiento (GH).
- Incremento de la masa muscular magra y reducción de grasa.
- Aceleración de la recuperación física y tisular.
- Mejora del sueño profundo y del sueño REM.
- Optimización del metabolismo basal y de la energía celular.
- Compatible con BPC-157, TB-500 y MOTS-c.

PROTOCOLO DE RECONSTITUCIÓN

Contenido Vial único 10 mg

- CJC-1295 sin DAC: 5 mg
- Ipamorelin: 5 mg

Reconstitución:

- Añadir 2 ml de agua bacteriostática al vial de 10 mg.
- Disolver suavemente sin agitar con fuerza.

Concentración final: 5 mg/ml (mezcla total).

- CJC-1295 sin DAC: 2.5 mg/ml
- Ipamorelin: 2.5 mg/ml

Estabilidad:

- Mantener refrigerado entre 2–8 °C.
- Vida útil: hasta 30 días reconstituido.

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis estándar:

- 0.1 ml por aplicación (0.5 mg de blend).
- Equivalente a 0.25 mg de CJC-1295 sin DAC.
- Equivalente a 0.25 mg de Ipamorelin.

Frecuencia:

- 1 vez al día (noche antes de dormir) o
- 2 veces al día (mañana en ayunas y noche).

Duración del ciclo: 8–12 semanas.**Recomendación:** aplicar siempre en tejido subcutáneo profundo en abdomen o muslo.

NOTAS CLÍNICAS Y PRECAUCIONES

- No utilizar en embarazo o lactancia.
- Evitar uso en pacientes con antecedentes de cáncer activo.
- Puede causar somnolencia ligera las primeras aplicaciones.
- Compatible con protocolos regenerativos y metabólicos combinados.
- Uso exclusivo bajo supervisión médica